


天然被膜タイプ乳頭ディッピング剤

キトサン入り

プロクール®



プロクールは、ベンザルコニウム塩化物の確かな殺菌消毒力とキトサン※の作る被膜で、乳頭への細菌の侵入を阻止します。ベンザルコニウム塩化物系では、日本で唯一動物用医薬品の認可を受けています。

※キトサンは、カニ殻を酸・アルカリ処理して得られる多糖類で、溶解したものは乾くと抗菌性を有する被膜を形成します。



18L キュービーテナー (コック付)

乳頭の荒れが気になる時に
乾燥の気になる冬場に

乳頭をなめらかに保ち、
乳頭に優しいディッピング剤です。



【使用開始時】



【使用開始後2ヶ月】

乳頭の荒れが無くなり、
なめらかになった

乳頭に汚れが付かない

手荒れが無くなった

お客様の声

牛が嫌がらない



天然被膜タイプ乳頭ディッピング剤

プロクール®

特長



1 キトサンの被膜で乳頭を保護

プロクールを使用するとベンザルコニウム塩化物(殺菌剤)の含まれた薄いキトサンの被膜を作ります。この被膜が乳頭口からの乳房炎原因菌の侵入を防ぎます。また、次の搾乳までの細菌の定着や増殖を阻止します。

2 優れた殺菌効果・抗菌性

プロクールに含まれるベンザルコニウム塩化物は、乳房炎原因菌に対して数十秒以内で確実な殺菌効果を示します。

3 牛が嫌がらない

プロクールは、皮膚・粘膜への刺激が少なく牛が嫌がりません。キトサン被膜とグリセリンの保湿により乳頭をなめらかに保ち、乳頭の荒れを防ぎます。

ベンザルコニウム塩化物とヨード系・殺菌効果と刺激性の比較

殺菌剤	ベンザルコニウム塩化物	ヨード系殺菌剤
特性		
殺菌力	◎	◎
皮膚刺激性	なし※1	強い
粘膜刺激性	○※2	強い
即効性	◎	◎

ベンザルコニウム塩化物は、ヨード系と同等の殺菌効果を有しながら、皮膚や粘膜への刺激の少ない、乳牛に優しいディッピング剤です。

※1パッチテストによる。

※2ベンザルコニウム塩化物は手術時の粘膜保護や目薬の保存液に用いられるほど、刺激性が少なく、安全性が認められています。

成分・分量	100mL中ベンザルコニウム塩化物0.1gを含有する。
効能・効果	乳頭の消毒
用法・用量	1) 乳頭を浸漬して、使用する場合: コップなどの容器に入れ、毎搾乳後乳頭を短時間浸漬する。 2) 乳頭に噴霧して使用する場合: 霧吹きなどの噴霧容器に入れ、毎搾乳後乳頭先端が完全に覆われるように噴霧する。
包装容器	18Lキュービーター(コック付き)
使用上の注意	1. 守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。 ・本剤は、効能・効果において定められた適応症の予防にのみ使用すること。 ・本剤を乳頭ディッピング以外の目的で使用しないこと。 (取り扱い及び廃棄のための注意) ・本剤は、多量の乳の混入により殺菌効果が減弱するので、混入を避けること。 ・一度使用した液で、長時間放置したものの再使用は避けること。 ・搾乳前、乳頭をよく清拭または洗浄すること。 ・子供の手の届かない所に保管すること。 ・直射日光を避けた涼しい場所に保管すること。 ・冬期間の保管場所は、マイナス10℃となると凍結が始まるので、必ず屋内に保管すること。 ・前絞り乳は廃棄すること。 ・使用開始時には、抽出口のミシン目を切り取り、キュービーターの抽出口を引き出し、中に入っているコックをしっかりと付け替えて使用すること。 2. 使用に際して気をつけること (使用者に対する注意) ・本剤の使用により、使用者に紅斑、掻痒感、浮腫等の過敏性症状があらわれた場合には使用を中止すること。 ・万一目に入った場合には多量の水で直ちに洗眼し、異常のある場合は医師の診断を受けること。 ・誤って飲み込んだときは、直ちに医師に相談すること。 (対象動物等に関する注意) ・本剤の使用により、家畜に紅斑、掻痒感、浮腫等の過敏性症状が現れた場合には使用を中止すること。

発売元

日曹商事株式会社

本社 東京都中央区日本橋本町3-3-6(ワカ末ビル) Tel.(03)3270-5503
大阪・名古屋・札幌・仙台・高岡・広島・福岡

製造販売元

株式会社バイロン

群馬県高崎市大八木888番地

取扱店